

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub

Pravidla:

- Z vybraných 10 hub rozeznat alespoň 9 a určit jedlá/nejedlá/jedovatá, popřípadě znát houbu se, kterou se dá zaměnit

Hřib kovář

Jedlý

Roste v jehličnatých, smíšených i listnatých lesích. Roste od října do května. Dá se splést s hřibem Kříšť, který je nejedlý, někdy se uvádí mírně jedovatý.



Holubinka zlatá

Jedlá

Nehojně v listnatých a smíšených lesích, pod duby, buky, habry, lískami a lípami mimo les na hrázích rybníků a v parcích. Narazit na ní můžeme v období od července do října.



Liška obecná

Jedlá

Roste od června do října, jednotlivě nebo ve skupinách v listnatých i jehličnatých lesích, zejména pod borovicemi, smrkem a buky.



Muchomůrka zelená

Jedovatá

Roste především v listnatých lesích od července do podzimu. Doprovází především duby, ale také habry a buky. Vzácněji ji lze nalézt i v borových lesích.



Ryzec hnědý

Jedovatý

Ve smíšených a jehličnatých lesích, často na rašeliništích a kyselých půdách pod borovicemi smrkou a břízami. Objevuje se od července do listopadu.



Klouzek obecný

Jedlý

Roste dost hojně, jednotlivě nebo ve skupinách pod borovicemi se dvěma jehlicemi ve svazku od nížin až do vysokohorského stupně. Najít jej můžeme od května do listopadu.



Křemenáč březový

Jedlý

Od června do října. Roste pod břízami, i v smrčinách, ale i mimo les, ve vřesovištích, rašeliništích atd.



Čirůvka holubičí

Jedlá

Roste vzácně pod listnáči od srpna do října. Často se zaměňuje s čirůvkou bílou a čirůvkou žlutnoucí, ale pozor tyto dvě jsou nejedlé.



Bedla vysoká

Jedlá

Bedla vysoká roste od července do října, někdy i do listopadu, nejvíce však v září. Často vyrůstá ve skupinách ve vysoké trávě lesních pasek, na okraji lesů listnatých i jehličnatých, nejvíce však ve smíšených lesích.



Hlíva ústříčná

Jedlá

Na kmenech a pařezech listnáčů, často buků a ořešáků, ale i na břízách či černém bezu. Vzácněji i na jehličnanech. Při mírných zimách roste od října až do února.



Hřib satan

Jedovatý

V teplomilných listnatých lesích, především pod habry, habrové doubravy, buky a duby. Od června do září.



Muchomůrka růžovka

Jedlá

Roste hojně v červnu až listopadu, v lesích všech typů. Vyskytuje se v celém mírném pásmu severní polokoule. Roste často i za suššího počasí. Je dosti hojná, nejvíce roste v srpnu a v září.



Hřib koloděj

Jedlý

Roste hojně v červnu až říjnu ve všech lesích, hlavně na okrajích, ale i mimo les, zvláště pod duby, lipami a jedlemi ale i břízami.



Hřib královský

Jedlý

Vyskytuje se pod listnáči, zejména v bučinách a doubravách, dubo-habrových hájích na vápencích ale vzácně i na nevápenatých půdách pod duby a buky, vzácně i pod břízami. Od května do září.



Hřib žlučník

Nejedlý

Jehličnaté lesy na chudých a kyselých půdách, ve stejném typu listnatých lesů na ztrouchnivělých pařezech a kolem nich. Vyskytuje se od června do října. Můžeme si jej splést s hřibem dubovým, smrkovým a hnědým.



Pečárka ovčí

Jedlá

Velmi hojně v listnatých a smíšených lesích, i ve smrčinách, v křovinách, parcích, na pastvinách. Roste od července do listopadu.



Muchomůrka červená

Jedovatá

Roste hojně, jednotlivě nebo i ve skupinách v jehličnatých, vzácněji i listnatých lesích nebo mimo les pod svými mykorrhizními partnery, zejména smrky, borovicemi a břízami. Od července do listopadu.



Hřib dubový

Jedlý

Roste od května do listopadu, většinou po vydatných deštích. Byly ovšem zaznamenány případy nálezu této houby v pozdním listopadu, kdy plodnice byly již zmrzlé. Vyskytuje se v listnatých lesích pod duby, buky, ale je možné jej také nalézt v lese březovém, nebo pod lípami.



Holubinka rudonohá

Nejedlá

Roste ve smrčinách, na kyselém podloží a to především ve vyšších polohách. Roste od července do listopadu.



Muchomůrka tygrovaná

Jedovatá

Roste jednotlivě i ve skupinách dost hojně ve všech druzích lesů. Vyskytuje se od května do října.

